

IMPFPPLAN für Standardimpfungen in Baden-Württemberg

| Impfschutz gegen | Anzahl der Grundimpfungen | Auffrischimpfung | Sonstiges |
|-----------------------------------|--|-------------------|--|
| Tetanus* | 3-4x | Alle 10 Jahre | Bei Minderjährigen erfolgen frühere Auffrischimpfungen. |
| Diphtherie* | 3-4x | Alle 10 Jahre | Bei Minderjährigen erfolgen frühere Auffrischimpfungen. |
| Keuchhusten (Pertussis)* | 3-4x | Alle 10 Jahre | Erwachsene 1x, sowie Schwangere u. Menschen mit viel Kinderkontakt |
| Kinderlähmung (Polio) | 3-4x | Ggf. 1x | |
| Haemophilus influenza Typ b (Hib) | 3x | | Nur für Kinder notwendig. Ggf. nach Knochenmarks-transplantation |
| Hepatitis B | 2-3x | Keine | Ggf. Titer-Kontrolle bei Bestimmten Berufen. Dann Nachimpfung. |
| Hepatitis A | 2x | Keine | Kombiimpfung mit Hep. A möglich. (Selbstzahler, mögliche Erstattung) |
| Influenza | Ab 60 J. | Jährlich | Als Wahlimpfung auch früher |
| FSME (Zecke) | 3x | Alle 3-5 Jahre | |
| Herpes zoster | 2x ab 60 J. | Keine | Bei manchen Vorerkrankungen früher |
| HPV-Viren | 2-3x | Keine | Beginn vor 18. Geburtstag |
| COVID 19 | 3x ab 18 J. | Ab 60 J. jährlich | Bei Vorerkrankungen früher |
| Masern, Mumps, Röteln (MMR) | - 2x im Alter < 18 J. - 1x im Alter > 18 J. | Keine | Nur Jahrgang 1970 und jünger |
| Windpocken (Varizellen) | 2x | Keine | Nur für Kinder notwendig |
| Meningokokken B,C | 1-3x | | Nur für Kinder |
| Pneumokokken | - 3-4x in den ersten beiden LJen,- 1x ab 60 J. | Keine | Auch bei Z.n. operativer Milzentfernung |

*gewöhnlich in Kombination zusammen geimpft: Kombination mit Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, ggf. Polio

IMPFPPLAN für zusätzliche Reiseimpfungen (abhängig vom Reiseland)

| Impfschutz gegen | Anzahl der Grundimpfungen | Auffrischimpfung | Sonstiges |
|-------------------------|---------------------------|------------------|--|
| Hepatitis A | 2x | Keine | |
| Tollwut | 3x | Alle 5 Jahre | |
| Typhus | 1x | Nach 3 Jahren | |
| Tollwut | 3x | Nach 2-5 Jahren | |
| Japanische Enzephalitis | 2x | Nach 1-2 Jahren | |
| Dengue | 1x | Keine | |
| Meningokokken | 1x | | Serotypen A,B,C,W,Y. Je nach Reiseland. |
| Gelbfieber | 1x | Nach 10 Jahren | Bis 60. Geburtstag, wir sind Gelbfieberstelle. |
| Cholera | 2x | 1x nach 2 Jahren | Nur als Schluckimpfung ab dem 2. LJ |

Weiterführende Informationen:

- Der Impfplan wurde gemäß den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) des Robert-Koch-Instituts erarbeitet. Viele Impfungen können zeitgleich verabreicht werden. Manche Impfungen müssen separat geimpft werden. Bitte beachten Sie, dass bei bestimmten Erkrankungen Abweichungen von den Empfehlungen notwendig sind. Ebenfalls sind bei bestimmten Berufsgruppen Modifizierungen/Erweiterungen notwendig.
- Erwartet wird demnächst eine Impfeempfehlung gegen das RSV-Virus für Erwachsene.
- Bitte beachten Sie, dass bei Reiseimpfungen vorab eine ärztliche Impfberatung in der Sprechstunde erfolgen muss. Urlaubs-/Reiseimpfberatungen müssen als Privatleistungen abgerechnet werden. Häufig erfolgt allerdings eine Kostenübernahme ganz oder teilweise durch die Gesetzlichen Krankenkassen (GKV). Es lohnt sich daher, wenn Sie aktiv bei Ihrer Krankenkasse bezüglich einer Kostenübernahme anfragen.

Stand: Februar 2024

Ist Ihr Impfstatus noch aktuell?

Gerne können Sie einen Termin zur Impfcheck, zur Impfung und/oder Auffrischung in unseren **m vb-Facharztpraxen für Allgemeinmedizin** kommen.